

【功能与主治】 清热，润燥，解毒。用于热病燥渴、咳喘、便秘等症。

【用法与用量】 作为胆乐胶囊制剂用原料。

【贮藏】 密封，避光，置阴凉干燥处。

猫 人 参

Maorenshe

RADIX ET RHIZOMA ACTINIDIAE VALVATAE

本品为猕猴桃科植物对萼猕猴桃（缳合猕猴桃）*Actinidia valvata* Dunn 或大籽猕猴桃 *Actinidia macrosperma* C.F.Liang 的干燥根及地下茎。夏、秋二季采挖，趁鲜切片，干燥。

【性状】 对萼猕猴桃 为不规则的厚片或段。表面浅黄棕色至棕褐色，粗糙，有纵裂纹。切面皮部类白色，有时可见白色亮晶状物，木部黄白色至淡棕色，导管孔散布（根）或成环状排列（茎）。有的有灰棕色的髓（茎）。质坚硬，水浸后有粘滑感。气微，味微涩，辛。

大籽猕猴桃 表面红棕色或紫褐色。切面皮部棕红色，有较多的白色亮晶状物。木部浅棕红色。

【鉴别】 （1）本品粉末浅棕黄色。石细胞淡黄褐色，散在或数个成群，长方形或类圆形，直径 20~95 μ m，壁厚，孔沟明显。纤维成束或散在，直径 10~35 μ m，壁厚，木化，纹孔明显。草酸钙针晶成束或散在。木栓细胞黄棕色，多角形。

（2）取本品 2g，加甲醇 10ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取猫人参对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照《中国药典》薄层色谱法试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-甲醇（20:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【炮制】 除去杂质；粗块者润软，切厚片，干燥。

【性味】 辛，温。

【功能与主治】 解毒消肿，祛风止痛。用于深部脓肿、骨髓炎、风湿痹痛、疮疡肿毒，麻风病、白带，以及萎缩性胃炎和消化道肿瘤的治疗。

【用法与用量】 30~60g，可用至 150g。

【贮藏】 置干燥处，防霉。

葫 芦 壳

Huluke

PERICARPIUM LAGENARIAE

本品为葫芦科植物葫芦 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. 及其变种瓠瓜 *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *depressa* (Ser.) HPara 的干燥成熟果皮。秋季采收成熟果实，干燥，敲碎，除去种子。

【性状】 为不规则的碎块，大小不一，厚 0.5~1.8cm。外表面黄棕色或灰黄色，较光滑；内表面黄白色或灰黄色，较粗糙，松软。体轻，质坚脆，易折断。断面黄白色或淡黄色，海绵状。气微，味淡。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰黄色。木化薄壁细胞成片，多破碎，完整者呈类多角形、类圆形、长方形或不规则状，有时可见数个纹孔相集成圆形纹孔域。石细胞黄色，多成群，长椭圆形、三角状或不规则形，壁厚，纹孔沟明显。

(2) 取本品粉末 0.5g，加乙醇 30ml，置水浴上温浸 30 分钟，滤过，滤液置蒸发皿中蒸干，加 5% 磷钼酸乙醇溶液 2 滴，水浴上加热后显深蓝色。

【炮制】 取原药，除去果梗、瓢及种子等杂质，洗净，切块，干燥。

【性味与归经】 甘，平。归肺、小肠经。

【功能与主治】 利水、消肿、散结。用于水肿，四肢面目浮肿，腹水肿胀，小便不利。

【用法与用量】 15~30g。

【贮藏】 置干燥处。